

Oversikt over antall isolater som fyller kriteriene for inklusjon i NORM

Ut fra et epidemiologisk perspektiv er det ønskelig å overvåke alle isolatene i en innsamlingsperiode fremfor et fast antall bakterieisolater ved hvert laboratorium. En slik metode innebærer at store laboratorier vil inkludere vesentlig flere isolater enn små laboratorier. NORM vil i 2006 holde fast ved den tidligere modellen der protokollen angir en innsamlingsstart og et antall isolater som skal samles inn. Vi vil imidlertid forberede overgangen til periodedefinert innsamling fra 2007 ved å samle inn informasjon om hvor mange isolater de ulike laboratoriene isolerer per uke (urin, sår, luftveier) eller måned (blodkulturer). På denne måten vil vi neste år har grunnlagstall til å definere fornuftige innsamlingsperioder med tilstrekkelig totalantall uten unødvendig belastning på de store laboratoriene.

		Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept	Okt
Blodkulturer	<i>E. coli</i>										
	<i>Klebsiella</i> spp.										
	<i>S. aureus</i>										
	<i>Enterococcus</i> spp.										
	<i>S. pneumoniae</i>										
	<i>S. pyogenes</i>										

		Uke 1	Uke 2	Uke 3	Uke 4	Uke 5	Uke 5
Urin	<i>E. coli</i>						
	<i>Proteus mirabilis</i>						

		Uke 1	Uke 2	Uke 3	Uke 4	Uke 5	Uke 6	Uke 7	Uke 8	Uke 9	Uke 10
Luftveger	<i>S. pyogenes</i>										

		Uke 1	Uke 2	Uke 3	Uke 4	Uke 5	Uke 6	Uke 7	Uke 8	Uke 9	Uke 10
Sårsekret	<i>S. aureus</i>										
	<i>S. pyogenes</i>										

Laboratorium