

Tiltak ved DRÅPESMITTE (inkludert MRSA)

- **Munnbind**
 - Brukes alltid ved dråpesmitte (unntak: ikke alltid ved MRSA)
 - MRSA: I stell, sengereing, av- og påkledning, sårstell, undersøkelse, renhold
- **Beskyttelsesfrakk**
 - I kontakt med pasient og utstyr
- **Hansker**
 - Anbefales ikke lenger rutinemessig på smitterom, men brukes:
 - ved forventet kontakt med kroppsvæsker
 - ved Norovirus (og ved skabb og C.diff.: se kontaktsmitte-kort)
- **Øyebeskyttelse**
 - ved opphold under 2 meter fra pasient med luftveisinfeksjon
 - ved risiko for sprut av kroppsvæsker



Daglig desinfeksjon av berøringspunkter - Velg rett desinfeksjonsmiddel

Bestikk/servise, avfall og tekstiler

- Vanlig servise og bestikk. Ved Norovirus vurderes engangs servise og bestikk.
- Avfall kastes som restavfall. Risikoavfall (gule bokser) når avfall er dryppvått av kroppsvæsker.
- Tekstiler skal være emballert når de tas ut av rommet.

Av smittevernsykepleiere som rådgir kommunehelsetjenesten, sykehusene i Helse Nord. Kontakt: skht@helse-nord.no Revidert sep. 2026

NB! Av personvern hensyn skal denne siden av kortet skjules

-----brett her-----

Vennligst henvend deg til personalet før du går inn på rommet

